

DIFFÉRENCES RÉGIONALES DANS LA CONSOMMATION DE TABAC EN FRANCE

13^e congrès de la Société Francophone de Tabacologie

21-22 novembre 2019

Dr Sylvie Quelet

1 – DONNÉES RÉGIONALES DE LA CONSOMMATION DE TABAC EN FRANCE

2-FOCUS SUR DEUX POPULATIONS SPÉCIFIQUES :

- FEMMES ENCEINTES**
- JEUNES**

3- DONNÉES RÉGIONALES DE MORBIMORTALITÉ

CONSOMMATION DE TABAC EN FRANCE

Données de consommation recueillies via les baromètres de Santé publique France

Dispositif d'enquêtes périodiques visant à mieux connaître les comportements, attitudes, connaissances et opinions des Français en matière de santé et à suivre ces indicateurs dans le temps.

Créé en 1992 pour :

- **aider au pilotage de programmes nationaux de prévention et « orienter » les campagnes de communication**
- **et contribuer à l'évaluation des politiques publiques.**


Ces enquêtes reposent sur :

- **des échantillons constitués par sondage aléatoire**
- **des interviews réalisées par téléphone**
- **Suivant les années et le nombre de personnes interrogées ,possibilités d'avoir des données régionales : 2017**

TABAGISME EN FRANCE

- Niveau élevé : en 2018, 25,4% des 18-75 ans fumaient quotidiennement (28,2% des hommes et 22,9% des femmes)
- Mais tendance à la baisse ces dernières années :- 1,6 million entre 2016 et 2018

Prévalence du tabagisme quotidien parmi les 18-75 ans en France métropolitaine entre 2000 et 2018



DIFFÉRENCES RÉGIONALES DE PRÉVALENCE DU TABAGISME QUOTIDIEN


TABAGISME QUOTIDIEN 2017

- En métropole : varie de 21% à 32% (moyenne : 26,9 %)
- Inférieur moyenne : IdF, PdL
- Supérieur moyenne : HdF, GE, Occ, PACA
- Prévalence nettement plus basse dans les DROM

Comparativement à 2014, deux régions affichaient une variation significative de la prévalence du tabagisme quotidien en 2017, dans le sens d'une baisse : IdF et Normandie

Prévalences régionales standardisées du tabagisme quotidien (18 à 75 ans) en 2017 (France métropolitaine) et en 2014 (DROM)

- Inférieur aux autres régions**
- Pas de différence significative
- Supérieur aux autres régions**



DES DIFFÉRENCES RÉGIONALES SELON LE SEXE

TABAGISME QUOTIDIEN FEMMES

- En métropole : varie de 18% à 29%
- Inférieur moyenne : IdF
- Supérieur moyenne : Occ, PACA


TABAGISME QUOTIDIEN HOMMES

- En métropole : varie de 24% à 36%
- Inférieur moyenne : IdF, PdL
- Supérieur moyenne : HdF, PACA

Prévalences régionales standardisées du tabagisme quotidien par sexe (18 à 75 ans) en 2017 (France métropolitaine) et en 2014 (DROM)


- Inférieur aux autres régions**
- Pas de différence significative
- Supérieur aux autres régions**

Femmes



- Inférieur aux autres régions**
- Pas de différence significative
- Supérieur aux autres régions**


Hommes



GRADIENT SOCIAL TRÈS MARQUÉ DU TABAGISME QUOTIDIEN

- 29% des adultes non diplômés ou avec un diplôme inférieur au Bac
- 26% des adultes ayant un diplôme équivalent au Bac
- 19% des adultes ayant un diplôme supérieur au Bac

Prévalence du tabagisme quotidien selon le niveau de diplôme parmi les 18-75 ans en France métropolitaine entre 2000 et 2018




TABAGISME DURANT LA GROSSESSE

TABAGISME QUOTIDIEN 2017

- En métropole : varie de 11% à 23%
- Inférieur moyenne : IdF
- Supérieur moyenne : façade atlantique
- Corse : 18%

Prévalences régionales standardisées du tabagisme au 3ème trimestre de grossesse, Enquête nationale périnatale 2016, France métropolitaine



Source : Enquête nationale périnatale 2016


DISPARITÉS RÉGIONALES DÈS 17 ANS

TABAGISME QUOTIDIEN À 17 ANS EN 2017

- En métropole : varie de 19% à 31%
- Près d'un tiers des 17 ans fument quotidiennement en Bretagne, Normandie et Corse
- Prévalence la plus faible : IDF, HDF, GE
- Prévalence nettement plus basse dans les DROM
- Prévalences élevées : point d'attention pour l'avenir

Prévalences régionales du tabagisme quotidien à 17 ans, Enquête Escapad 2017, France entière (hors Mayotte)

■ Inférieur aux autres régions*
■ Pas de différence significative
■ Supérieur aux autres régions*



MORBIDITÉ ET MORTALITÉ ASSOCIÉES AU TABAC

INCIDENCE DU CANCER DU POUMON

INCIDENCE FEMMES : 17,9 pour 100 000

- Inférieure moyenne : HDF, ARA, DFA, PDL
- Supérieure moyenne : Corse, Occitanie, IDF, GE, PACA


INCIDENCE HOMMES : 51,8 pour 100 000

- Inférieure moyenne : DFA, PDL, IDF, ARA, CVDL
- Supérieure moyenne : HDF, GE, Normandie
- Corse : dans la moyenne

Taux régionaux standardisés (pour 100 000) d'incidence du cancer du poumon en 2007-2016


- Inférieur à la moyenne nationale *
- Pas de différence significative
- Supérieur à la moyenne nationale *

Femmes



- Inférieur à la moyenne nationale *
- Pas de différence significative
- Supérieur à la moyenne nationale *

Hommes




HOSPITALISATION POUR EXACERBATION DE BPCO

En métropole : moyenne de 22,1 hospitalisations pour 10 000 habitants âgés de 25 ans ou plus

- Beaucoup plus élevé en GE et HdF et La Réunion
- Prévalence nettement plus basse en Corse notamment, DFA et PDL

Taux régionaux standardisés (pour 10 000) d'hospitalisation pour exacerbation de BPCO en 2015



MORTALITÉ PAR CANCER DU POUMON, CARDIOPATHIE ISCHÉMIQUE ET BPCO


MORTALITÉ FEMMES : 69,3 POUR 100 000

- Inférieur moyenne : Antilles et Guyane
- Supérieur moyenne : Bretagne, G-E, Corse

MORTALITÉ HOMMES : 200 pour 100 000

- Inférieur moyenne : IdF, Antilles et Guyane
- Supérieur moyenne : Normandie, HdF, G-E et La Réunion

Taux régionaux standardisés (pour 100 000) de mortalité par cancer du poumon, cardiopathie ischémique et BPCO selon le sexe en 2013-2015



- Niveau de consommation de tabac encore très élevé en comparaison des autres pays ,malgré les récents progrès:
 - 1/3 adultes fumeur en France
 - Environ un quart en Allemagne, Belgique et Pays-Bas
 - Un cinquième en Italie
 - 16% en Grande-Bretagne
 - 15% en Australie et aux Etats-Unis
- Situation hétérogène en fonction des territoires et des populations avec une inquiétude particulière pour les jeunes et femmes enceintes
- Ces données tant géographiques que populationnelles ont vocation à :
 - > permettre aux acteurs locaux de décrire le tabagisme dans leur région afin de lutter plus efficacement avec des actions de prévention adaptées au territoire
- La situation évolue :
 - > données du baromètre de Santé publique France 2020 permettront de mesurer les évolutions récentes