

CSFT

LE TABAGISME DERRIÈRE LES BARREAUX :

Quand les femmes fument comme les hommes

Tiffany Zahnd, Aurélie Augsburgers, Joëlle Schwarz, Véronique
Jaquier, Carole Clair

Femmes incarcérées

Une population vulnérable

- Minoritaire et minorisée
- Particulièrement vulnérable sur le plan de la santé physique et psychique
- Avec des besoins spécifiques souvent invisibilisés

Des besoins spécifiques



Santé physique

- Troubles respiratoires, digestifs
- Maladies chroniques
- Maladies de santé sexuelle et reproductive



Santé mentale

- Troubles anxieux
- Troubles dépressifs
- Automutilation



Santé préventive

- Dépistage
- Littéracie en santé



Intervention

- Genre
- Traumatisme
- Autonomisation
- Collaboration prison-communauté

Le tabagisme dans les prisons suisses

Interdiction de fumer dans les lieux publics mais...

- Exception concernant les lieux de détention ou de séjour prolongé
- Liberté individuelle vs intérêt public
- Règlement dépendant des lieux de détention

GIPSGroupeInterfacultairePrison SantéInégalités

S'allier pour pallier des ressources déficientes

1. Évaluer la santé globale des femmes incarcérées, leurs besoins en terme de santé et l'accès aux mesures de prévention
2. Évaluer comment l'expérience de la prison influence la santé des femmes incarcérées
3. Développer des recommandations pour la promotion d'intervention spécifique au genre et de prévention dans le milieu carcéral

Protocole

Enquête quantitative, santé

- Revue des dossiers médicaux, 60 femmes
- Entretien CAPI, 75 min, $n=60$
 - Femme ≥ 18 ans incarcérée depuis ≥ 4 semaines
 - Consentement libre et éclairé
 - Stabilité psychiatrique
 - Recrutement: flyers, présentations, équipe soignante

Enquête exploratoire qualitative, santé subjective

- Entretien semi-directif court, sous-échantillon

Entretien CAPI

Santé physique

- Inmate Health Survey, adapté

Santé mentale

- Dépression, PHQ-9
- Anxiété, GAD-7
- Stress perçue, PSS-10
- Image de soi, BIQ
- Sommeil, MOS Sleep Scale

Qualité de vie

- Général, WHOQOL Bref
- Carcérale, MQPL⁺ adapté

Comportements à risque

- Alcool, AUDIT
- Drogue, DAST 10
- Tabac, Fagerström

Ressources personnelles

- Coping, Brief-COPE
- Estime de soi, Rosenberg

Maternité


- Stress parental, PSS

Résultats

Comportements en santé chez les femmes en milieu
carcéral

Caractéristiques socio-démographiques


Participant^{es}, $n = 60$



Prévalence et évolution de la consommation de tabac

| Tabagisme (%) | actif | ancien | aucun |
|----------------------|-------|--------|-------|
| Population carcérale | | | |
| Féminine | 79.6 | 5.1 | 15.3 |
| Masculine | 84 | 3 | 13 |
| Communauté | | | |
| Féminine | 23.3 | 18.8 | 59.7 |
| Masculine | 31.0 | 24.2 | 44.7 |


Evolution de la consommation de tabac



Habitudes de consommation en quelques chiffres


- 16 ans : âge moyen du début de consommation
- 94% : femmes consommant du tabac quotidiennement
- 76 cigarettes : consommation hebdomadaire moyenne

Nicotine dependance (FTND, valid n=44)




Troubles anxieux et tabagisme

Niveau d'anxiété (GAD-7) selon le status tabacologique




Evolution de la consommation de tabac et niveau d'anxiété (GAD-7)




Perception du stress et tabagisme

Perception du stress (PSS-10) selon le status tabacologique



Evolution de la consommation de tabac et perception du stress (PSS-10)



Discussion

En plus de la dépendance...

- Vertus anxiolytiques, occupationnelles et de plaisir
- Monnaie d'échange

Population vulnérable

- Faible niveau socio-économique
- Comportements en santé à risque
- Faible accès aux soins de santé avant l'incarcération

Pistes de réflexion

Stratégies

- Prévention et éducation à la santé
- Aide à l'arrêt du tabac : intervention brève, aide pharmacologique
- Approches participatives et multi-professionnelles

Défis

- Ressources
- Résistances
- Séjours courts

Références

Walmsley, *World female imprisonment list: Women and girls in penal institutions 2012*

Braithwaite RR, Treadwell HM, Arriola KRJ, Health disparities and incarcerated women: A population ignored, 2005

Harner HM, Riley S, Factors contributing to poor physical health in incarcerated women, 2013

Wolff H, Sebo P, Haller D, Eytan A, Niveau G, Bertrand D, Getaz L, Cerutti B, Health problems among detainees in Switzerland: A study using the icpc-2 classification, 2011; Eytan A, Haller DM, Wolff H, Cerutti B, Sebo P, Bertrand D, Niveau G, Psychiatric symptoms, psychological distress and somatic comorbidity among remand prisoners in Switzerland, 2011

Semple S, *et al. Tob Control* 2019;0:1–3. doi:10.1136/tobaccocontrol-2018-054895

Ritter C. and al, Second-hand tobacco smoke in prison: Tackling a public health matter through research, Public Health, Volume 127, February 2013

Ritter C. and al Smoking in prisons: The need for effective and acceptable intervention, *Journal of Public Health Policy*, 2011

Références

Cornuz J, Jacot-Sadowski I, Nanchen D, et al. Primary prevention and screening in adults: update 2014. Rev Med Suisse. 2014.

<https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/fr/tabac/consommation.html>

<http://www.who.int>

<http://www.admin.ch>