CSFT 2021

15^e
Congrès
de la Société
Francophone
de Tabacologie

25 & 26 novembre 2021

Sortir du tabac :
une priorité pour tous !

CIGARETTES ÉLECTRONIQUES, TABACS CHAUFFÉS ET ORAUX ET SANTÉ BUCCALE

JC FRICAIN

Professeur des Universités-Praticien Hospitalier

Responsable Unité médicale de pathologie de la muqueuse buccale et douleur oro-faciale

Service de Chirurgie orale

CHU Bordeaux

TABACS ORAUX en occident

- Tabac non fumé = Smokeless tobacco
- Tabac à mâcher ou chiquer = chewing tobacco
- Tabac à priser = snuff (USA) à inhaler et moist snuff = snus (suède) utilisé comme tabac oral placé dans cavité buccale

Moist snuff

Dry snuff

Snus

Tabac à chiquer ou mâcher

TABACS ORAUX en orient

Table Types and ingredients of smokeless tobacco (SLT) products

Types of SLT	Ingredients	Population
Betel quid	Paan + areca nut + tobacco	South Asian Region
<i>Khaini</i>	Tobacco + lime	North India
<i>Mishri</i>	Burnt tobacco	Maharashtra, India
<i>Zarda</i>	Boiled tobacco	Bangladesh/Arab countries
<i>Gudakhu</i>	Tobacco + molasses	Central India
<i>Mava</i>	Tobacco + lime + areca	Bahavanager, India
<i>Nass</i>	Tobacco + ash + cotton oil	Former USSR
<i>Naswar</i>	Tobacco + lime	Pakistan
<i>Toombak</i>	Tobacco + sodium bicarbonate	Sudan
<i>Shammah</i>	Tobacco + ash + lime	Saudi Arabia/Yemen
<i>Gutka</i>	Tobacco + areca nut mixed with lime, flavouring agents.	India and South East Asia

Chique de Betel

Gutka

Consommation de tabacs oraux

1. Number (in millions) and proportion (%) of smokeless tobacco users among adults in 70 countries, by World Health Organization region

Consommation Tabac oraux en suisse

SNUS et santé buccale

- Pas d'effet sur dents et parodonte
- Effet sur la muqueuse buccale: « leucoplasie »

SNUS et santé buccale

- **Faible risque de survenue d'un carcinome épidermoïde de la cavité buccale**

Int. J. Cancer: 119, 392–397 (2006)

© 2006 Wiley-Liss, Inc.

A long-term follow-up study on the natural course of snus-induced lesions among Swedish snus users

Ann Roosaar^{1,2*}, Anna L.V. Johansson², Gonilla Sandborgh-Englund¹, Olof Nyren² and Tony Axell³

¹*Institute of Odontology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden*

²*Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden*

³*Maxillofacial Unit, Halmstad Hospital, Halmstad, Sweden*

- 1115 « leucoplasies » sur 24591 personnes consommatrices de snus examinées
- 3 cancers de la cavité buccale dont 2 fumeurs de cigarettes et cancers développés à distance des leucoplasies (période de suivie de 19 ans)

SNUFF et santé buccale

- La consommation de SNUFF aux USA augmente le risque de carcinome épidermoïde

Smokeless tobacco and cancer

Paolo Boffetta ¹, Stephen Hecht, Nigel Gray, Prakash Gupta, Kurt Straif

Affiliations + expand

PMID: 18598931 DOI: [10.1016/S1470-2045\(08\)70173-6](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(08)70173-6)

THE LANCET
Oncology

	Countries	Number of risk estimates	p*	Relative risk (95% CI)	p†
Oral cancer	Overall	13	<0.001	1.8 (1.1–2.9)	..
	USA	9	<0.001	2.6 (1.3–5.2)	..
	Nordic countries	4	0.4	1.0 (0.7–1.3)	0.01

Tabacs oraux et risques de carcinome épidermoïdes de la cavité buccale en orient

- **Le risque relatif varie en fonction des tabac et des additifs**

Association of Smokeless Tobacco Use and Oral Cancer: A Systematic Global Review and Meta-Analysis

Smita Asthana MD¹, Satyanarayana Labani PhD¹, Uma Kailash PhD¹, Dharendra N. Sinha MD², Ravi Mehrotra MD³

Nicotine & Tobacco Research, 2019, 1162–1171

doi:10.1093/ntr/nty074

Review

Received April 27, 2017; Editorial Decision April 3, 2018; Accepted April 12, 2018

Le risque relatif de développer un cancer oral est de :

- **Gutkha : 8.67** (95% CI = 3.59 to 20.93),
- **Pan tobacco / betel liquid : 7.18** (95% CI = 5.48 to 9.41),
- **Mainpuri tobacco: 3.32** (95% CI = 1.32 to 8.36),
- **Oral snuff: 4.18** (50% CI = 2.37 to 7.38),
- **Snus : 0.86** (95% CI = 0.58 to 1.29).

Tabacs oraux et risques de cancer oral

Int. J. Cancer: 116, 16–19 (2005)
© 2005 Wiley-Liss, Inc.

Tobacco-specific nitrosamines in smokeless tobacco products marketed in India

Irina Stepanov¹, Stephen S. Hecht^{1,2}, Sreevidya Ramakrishnan² and Prakash C. Gupta³

¹The Cancer Center, University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA

²Tata Memorial Centre, Mumbai, India

³Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, India

Grande variabilité des concentration en carcinogène des tabacs non fumés

TABLE 1 – TOBACCO-SPECIFIC NITROSAMINES, NITRATE, NITRITE, AND NICOTINE IN INDIAN SMOKELESS TOBACCO AND RELATED PRODUCTS¹

Product	Tobacco-specific nitrosamines (µg/g) ²				NO ₂ (µg/g) ²	NO ₃ (µg/g) ²	Nicotine (mg/g) ³
	NNN	NAT	NAB	NNK			
Khaini							
Raja	76.9	13.8	8.83	28.4	705	1,020	21.3
Hans Chhap	39.4	4.83	3.78	2.34	1,090	1,410	19.6
Zarda							
Goa 1000	8.36	1.98	0.48	3.09	966	2.20	14.6
Moolchand Super	6.47	0.64	0.46	1.64	1,320	ND	15.0
Sanket 999	7.77	1.51	0.36	1.99	1,910	2.08	65.0
Baha 120	4.81	1.40	0.19	1.07	1,700	1.63	44.2
Shimla	19.9	1.53	1.19	2.61	1,360	2.53	13.8
Other Tobacco							
Hadhi Chhap	2.75	1.53	0.23	0.85	2,760	1.97	39.5
Gai Chhap	19.2	11.9	1.57	2.61	2,950	8.40	47.8
Miraj	1.74	0.35	0.12	0.08	1,420	13.6	15.6
Mishri							
Shahin	4.21	2.55	0.15	0.87	1,720	5.18	21.0
Gutka							
Star 555	0.47	0.07	0.02	0.13	417	1.61	6.77
Manikchand	0.38	0.05	0.01	0.12	43.9	2.00	3.22
Zee	0.32	0.05	0.01	0.08	62.3	3.42	3.31
Tulsi Mix	0.69	0.07	0.02	0.31	184	2.58	5.67
Wiz	0.31	0.04	0.02	0.13	215	2.82	1.67
Kubor	0.32	0.03	0.01	0.13	47.3	4.50	1.23
Pun Parag	0.44	0.06	0.02	0.12	332	2.84	2.67
Zatpat	1.09	0.08	0.05	0.43	171	1.99	5.48
Vimal	0.09	0.01	ND	0.04	268	1.58	6.82
Josh	0.49	0.08	0.03	0.20	252	1.74	11.4
Supari							
Goa	ND	ND	ND	ND	7.5	4.71	NA
Moolchand	ND	ND	ND	ND	8.5	2.48	NA
Rajasingandha	ND	ND	ND	ND	8.8	3.34	NA
Sanket	ND	ND	ND	ND	8.5	4.27	NA
Shimla	ND	ND	ND	ND	8.0	6.56	NA
Creamy snuff/toothpaste							
IPCO	3.32	0.53	0.11	1.31	580	ND	4.71
Dentohac	2.52	1.49	0.07	2.16	232	ND	7.71
Snuff							
Click	0.56	0.38	0.02	0.24	2,260	ND	71.4
Tooth powder							
Baidyanath	0.04	ND	ND	ND	48.6	ND	0.72
New Roshanjiyot	ND	ND	ND	ND	11.6	1.25	0.25
Dabur	0.04	ND	ND	ND	27.6	ND	0.58
Reference snuff							
Kentucky IS3	3.39	3.15	0.25	0.94	3.86	6.35	36.2

¹All data per gram wet weight. ND, not detected; detection limit 50 µmol/g tobacco; NA, not analyzed. ²Mean of duplicate analyses of product from one package. ³Mean of duplicate injections of a single sample. ⁴Single determination.

Formes cliniques des cancers oraux induits par tabacs oraux:

CARCINOME ÉPIDERMOÏDE

- 80 % K au niveau de la zone de placement de la chique
- 20 % K plancher et bord de langue par diffusion carcinogène dans la salive
- Aggressivité +++ (extension ganglionnaire et métastatique)
- TT: Chirurgie, radiothérapie +/- thérapies ciblées-immunothérapie
- Survie < 40% 5 ans
- Morbidité +++ post traitements
- Différentes formes cliniques

Le carcinome épidermoïde de la cavité buccale est une maladie grave!

«Petite lésion»

Graves conséquences

Carcinome épidermoïde: comment les reconnaître?

Néoplasme tissulaire

Carcinome épidermoïde: comment les reconnaître?

Néoplasme tissulaire

Carcinome épidermoïde: comment les reconnaître?

Ulcération

Ulcération à bords surélevés

Une ulcération chronique (>15j) doit être biopsiée quelque soit la forme clinique.

Carcinome épidermoïde: comment les reconnaître?

Fissure

Carcinome épidermoïde: comment les reconnaître?

Plaque blanche et rouge

Carcinome épidermoïde: comment les reconnaître?

Signes d'évolution

Trismus

Adénopathie

Formes cliniques des cancers oraux induits par tabacs oraux:

CARCINOME VERRUQUEUX

- Aspect verruciforme
- Localisé à l'endroit où est placé le tabac
- Évolution lente
- Rare/carcinome épidermoïde
- 65-70 ans
- Tabac non fumé (betel+++)
- Traitement : arrêt tabac et exérèse chirurgicale

Lésions précancéreuses favorisées par les tabacs oraux

LEUCOPLASIE HOMOGÈNE

- Plaque blanche kératosique **idiopathique** ou associé à la consommation de **tabac** et/ou noix d'arec.
- 8-10 % transformation maligne
- TT: Arrêt tabac- éxérèse

TRAITEMENT LEUCOPLASIE INHOMOGENE: sevrage tabagique

Lésions précancéreuses favorisées par
les tabacs oraux

LEUCOPLASIE INHOMOGENE

TRAITEMENT LEUCOPLASIE INHOMOGENE: sevrage tabagique

1 mois de sevrage

Martin JC, **97% rémission leucoplasie** due tabac non fumé
(J Am Dent Assoc 1999)

TRAITEMENT LEUCOPLASIE INHOMOGENE: sevrage tabagique

6 mois après sevrage

Lésions précancéreuses favorisées par les tabacs oraux

ERYTHROPLASIE

- Plaque rouge **idiopathique** ou associé à la consommation de **tabac** et/ou noix d'arec.
- 40 % transformation maligne
- TT: Arrêt tabac-
exérèse

Mia Hashibe, Babu Mathew, Binu Kuruvilla,
Gigi Thomas, Rengaswamy Sankaranarayanan,
Donald Maxwell Parkin, and Zuo-Feng Zhang²

Department of Epidemiology, University of California-Los Angeles School of Public Health, Los Angeles, California 90095-1772 [M. H., Z.-F. Z.]; Regional Cancer Centre, Trivandrum 695011, India [B. M., B. K., G. T.]; and Unit of Descriptive Epidemiology, IARC, 69372, Lyon Cedex 08, France [R. S., D. M. P.]

Chewing Tobacco, Alcohol, and the Risk of Erythroplakia¹

Table 2 Chewing tobacco habits and risk of erythroplakia (ORs and 95% CIs)

	Cases	Controls	Crude OR (95% CI)	Adjusted OR ^a (95% CI)	Further adjusted OR ^b (95% CI)
Chewing tobacco					
No chewing	9	34,373	1.0	1.0	1.0
Ever chewing	91	13,400	25.9 (13.1–51.5)	20.6 (10.2–41.5)	19.8 (9.8–40.0)
Chewing tobacco					
No chewing	9	34,373	1.0	1.0	1.0
Past	10	1,276	29.9 (12.1–13.5)	26.8 (13.1–54.7)	25.8 (12.6–52.8)
Occasional	2	2,625	2.9 (0.6–13.5)	2.4 (0.5–11.1)	2.3 (0.5–10.9)
Current	79	9,499	31.7 (15.9–63.3)	29.4 (11.6–74.6)	27.6 (10.8–70.4)
Frequency of chewing (times per day)					
Continuous			1.05 (1.03–1.07)	1.04 (1.02–1.06)	1.04 (1.02–1.06)
No chewing	9	34,373	1.0	1.0	1.0
1–10	60	8,991	25.5 (12.6–51.4)	23.8 (11.5–49.3)	28.6 (14.0–58.7)
11–20	18	1,443	47.6 (21.4–106.2)	39.1 (17.0–90.1)	49.8 (22.0–113.1)
≥20	11	271	155.0 (63.7–377.1)	100.4 (39.3–256.8)	130.8 (52.5–326.3)
Missing	2	2,695			
P for trend			0.0001	0.0001	0.0001
Duration of chewing (yr)					
Continuous			1.01 (0.99–1.02)	1.02 (1.00–1.04)	1.01 (0.99–1.03)
No chewing	9	34,373	1.0	1.0	1.0
1–20	42	5,971	26.9 (13.1–55.2)	23.7 (11.3–49.6)	29.3 (14.2–60.8)
21–40	38	3,470	41.8 (20.2–86.6)	41.4 (19.0–90.1)	53.3 (24.7–114.8)
≥40	9	1,217	28.2 (11.2–71.3)	40.6 (14.0–117.4)	52.8 (18.3–152.6)
Missing	2	2,742			
P for trend			0.0001	0.0001	0.0001

Le risque d'érythroplasie augmente avec la fréquence et la durée de mastication

Mia Hashibe, Babu Mathew, Binu Kuruvilla,
Gigi Thomas, Rengaswamy Sankaranarayanan,
Donald Maxwell Parkin, and Zuo-Feng Zhang²

Department of Epidemiology, University of California-Los Angeles School of Public Health, Los Angeles, California 90095-1772 [M. H., Z.-F. Z.]; Regional Cancer Centre, Trivandrum 695011, India [B. M., B. K., G. T.]; and Unit of Descriptive Epidemiology, IARC, 69372, Lyon Cedex 08, France [R. S., D. M. P.]

Chewing Tobacco, Alcohol, and the Risk of Erythroplakia¹

Table 4 Risk of erythroplakia and interactions between chewing, smoking, and drinking

	Cases	Controls	Crude OR (95% CI)	Adjusted OR ^a (95% CI)	Further adjusted OR ^b (95% CI)
Chewing/Smoking					
No/No	3	26,731	1.0	1.0	1.0
No/Yes	6	7,642	7.0 (1.7–28.0)	5.6 (1.3–24.0)	5.8 (1.3–25.3)
Yes/No	54	8,836	54.5 (17.0–174.2)	43.0 (13.2–140.0)	43.3 (13.3–141.1)
Yes/Yes	37	4,564	72.2 (22.3–234.4)	53.6 (15.2–188.5)	50.1 (14.1–178.4)
Chewing/Drinking					
No/No	6	30,566	1.0	1.0	1.0
No/Yes	3	3,807	4.0 (1.0–16.1)	3.8 (0.9–16.3)	3.7 (0.9–16.1)
Yes/No	56	10,235	27.9 (12.0–64.7)	22.6 (9.6–53.5)	22.7 (9.6–53.7)
Yes/Yes	35	3,165	56.3 (23.7–134.0)	43.6 (16.4–116.1)	43.1 (16.1–115.3)
Drinking/Smoking					
No/No	48	34,472	1.0	1.0	1.0
No/Yes	14	6,329	1.6 (0.9–2.9)	2.2 (1.0–4.8)	2.1 (1.0–4.4)
Yes/No	9	1,095	5.9 (2.9–12.1)	8.1 (3.0–21.9)	4.8 (1.8–13.1)
Yes/Yes	29	5,877	3.5 (2.2–5.6)	5.9 (2.5–13.7)	4.7 (2.0–10.6)

- Fumer augmente peu le risque d'érythroplasie chez les masticateurs de tabacs oraux
- Boire de l'alcool double le risque d'érythroplasie chez les masticateurs de tabacs oraux
- L'alcool seul est un facteur de risque d'érythroplasie plus important que fumer

Lésions précancéreuses favorisées par les tabacs oraux

ERYTHROPLASIE

2019 (dysplasie haut grade)

2021

Lésions précancéreuses favorisées par les tabacs oraux

FIBROSE ORALE SOUS MUQUEUSE

Asie et inde +++

Étiologie: noix AREC et pas tabac

Diagnostic:

- Ulcération
- Sensation brulure
- Blancheur muqueuse buccale
- Bandes fibreuses palpables parfois associées à trismus

Localisation:

- Cavité buccale
- Naso-pharynx
- Œsophage

Évolution:

- Transformation maligne fréquente
- Non réversible à arrêt du bétel

TAKE HOME MESSAGE

- Consommation des tabacs oraux est un facteur de risque de lésions précancéreuses et de cancers de la cavité orale à l'exception du snus.
- Il faut examiner la cavité orale des consommateurs de tabacs oraux.
- Une biopsie doit être réalisée devant toute lésion de la muqueuse orale imputable au tabacs oraux.
- Le sevrage tabagique est la première étape du traitement des lésions orales à potentiel malin à l'exception de la fibrose orale sous muqueuse qui est irréversible.

LES CIGARETTES SANS FUMEE

Évolution de l'offre des « cigarettes sans fumée »

Note : Le tableau ne présente que quelques-unes des centaines de marques de cigarettes électroniques qui existent.

TABACS CHAUFFES

- **Chauffage du tabac à 350 degrés pour produire de la nicotine qui est aspiré sous forme d'aérosol**
- **Différence avec cigarette classique:** absence de combustion (600 degrés) et de fumée
- **Différence avec la cigarette électronique:** ce n'est pas un liquide qui est chauffé mais du tabac

Heat-Not-Burn Tobacco Cigarettes: Smoke by Any Other Name

JAMA Internal Medicine July 2017 Volume 177, Number 7

Table. Concentrations of 8 Volatile Organic Compounds, 16 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, 3 Inorganic Compounds, and Nicotine in Mainstream Aerosol and Temperature of the HNB IQOS Cigarette and Conventional Cigarettes

Analyzed Compound	HNB Cigarette		Conventional Cigarette		Proportion of the Chemical in HNB and Conventional Cigarettes, %
	Amount, Mean (SD)	No. of Replications for Each Assay	Amount, Mean (SD)	No. of Replications for Each Assay	
Volatile organic compounds, µg per cigarette ^a					
Acetaldehyde	133 (35)	5	610 ^b	1	22
Acetone	12.0 (12.9)	5	95.5 (13.5)	2	13
Acroleine	0.9 (0.6)	2	1.1	1	82
Benzaldehyde	1.2 (1.4)	5	2.4 (2.6)	2	50
Crotonaldehyde	0.7 (0.9)	5	17.4	1	4
Formaldehyde	3.2 (2.7)	5	4.3 (0.4)	2	74
Isovaleraldehyde	3.5 (3.1)	5	8.5 (10.8)	2	41
Propionaldehyde	7.8 (4.3)	5	29.6 (36.6)	2	26
Inorganics, ppm in the mainstream smoke ^d					
Carbon dioxide	3057 (532)	5	>9000	3	NA
Carbon monoxide	328 (76)	5	>2000	3	NA
Nitric oxide	5.5 (1.5)	5	89.4 (71.6)	3	6
Other measures					
Nicotine, µg per cigarette ^a	301 (213)	4	361	1	84
Temperature, °C	330 (10)	2	684 (197)	1	NA
Puff total count	12.6 (2.4)	32	13.3 (3.1)	6	NA

Heat-Not-Burn Tobacco Cigarettes: Smoke by Any Other Name

JAMA Internal Medicine July 2017 Volume 177, Number 7

Table. Concentrations of 8 Volatile Organic Compounds, 16 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, 3 Inorganic Compounds, and Nicotine in Mainstream Aerosol and Temperature of the HNB IQOS Cigarette and Conventional Cigarettes

Analyzed Compound	HNB Cigarette		Conventional Cigarette		Proportion of the Chemical in HNB and Conventional Cigarettes, %
	Amount, Mean (SD)	No. of Replications for Each Assay	Amount, Mean (SD)	No. of Replications for Each Assay	
Polycyclic aromatic hydrocarbons, ng per cigarette ^c					
Naphthalene	1.6 (0.5)	4	1105 (269)	7	0.1
Acenaphthylene	1.9 (0.6)	4	235 (39)	7	0.8
Acenaphthene	145 (54)	4	49 (9)	7	295
Fluorene	1.5 (0.6)	4	371 (56)	7	0.4
Anthracene	0.3 (0.1)	4	130 (18)	7	0.2
Phenanthrene	2.0 (0.2)	4	292 (44)	7	0.7
Fluoranthene	7.3 (1.1)	4	123 (18)	7	6
Pyrene	6.4 (1.1)	4	89 (15)	7	7
Benz[a]anthracene	1.8 (0.4)	4	33 (4.2)	7	6
Chrysene	1.5 (0.3)	4	48 (6.2)	7	3
Benzo[b]fluoranthene	0.5 (0.2)	4	24 (2.9)	7	2
Benzo[k]fluoranthene	0.4 (0.2)	4	4.3 (2.8)	7	9
Benzo[a]pyrene	0.8 (0.1)	4	20 (2.9)	7	4
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	ND	4	NA	NA	NA
Benzo[ghi]perylene	ND	4	NA	NA	NA
Dibenzo[a,h]anthracene	ND	4	NA	NA	NA

Oral cancer and tobacco: developments in harm reduction

M. N. Pemberton¹

BRITISH DENTAL JOURNAL | Advance Online Publication | NOVEMBER 2 2018

Table 2 Comparison of conventional cigarettes, heat-not-burn (HNB) cigarettes and e-cigarettes

Conventional cigarettes	HNB cigarettes	e-cigarettes
Tobacco containing	Tobacco containing	Tobacco extract, or non-tobacco, containing
Nicotine containing	Nicotine containing	Nicotine or non-nicotine containing
Burning of tobacco (>800°C)	Heating of tobacco (<350°C)	Heating of e-liquid
Smoke generated	Predominantly aerosol generated	Aerosol generated
Smoke contains significant levels of carcinogens	Aerosol contains some carcinogens	Aerosol contains low or insignificant levels of carcinogens

REVIEW ARTICLE

The oral health impact of electronic cigarette use: a systematic review

Irene Yang^a , Shelly Sandeep^b and Jeannie Rodriguez^a

^aNell Hodgson Woodruff School of Nursing, Emory University, Atlanta, GA, USA; ^bEmory University Midtown Hospital, Emory University, Atlanta, GA, USA

- Résultats des études peu concluant
- Risques moindres qu'avec cigarette fumée
- Prévalence parodontite supérieure à non fumeur mais études contradictoires
- Perte osseuse péri-implantaire supérieure à non fumeur
- Fêlures dentaires et dents fracturées plus nombreuses que chez les non fumeurs
- Augmentation des caries dentaires par rapport au non fumeur

Dermatologic manifestations associated with electronic cigarette use

Michael J. Visconti, BSc,^a and Kurt A. Ashack, MD^b
East Lansing, Michigan, and Chicago, Illinois

J AM ACAD DERMATOL OCTOBER 2019
VOLUME 81, NUMBER 4

Stomatite nicotinique

Langue villoseuse

perlèche

?...
?

TAKE HOME MESSAGE

- Effets à long terme des cigarettes non fumées sur la santé orale restent à déterminer.
- La cigarette électronique est moins nocive que la cigarette fumée mais elle pourrait avoir des effets délétères sur les tissus parodontaux et les dents
- Les tabacs chauffés contiennent des substances cancérigènes en quantité moindre que le tabac fumé mais leurs effets sont à étudier